* La specie è molto rara in Sicilia. Dopo la sua estinzione locale, si conoscono soltanto 4 segnalazioni.

Avvistamento di Gracchio corallino *Pyrrhocorax pyrrhocorax* all'Isola di Capraia (Arcipelago Toscano).

P. Sposimo

Tra ottobre e dicembre 2000 un ind. è stato ripetutamente osservato all'Isola di Capraia (LI), mentre stazionava nell'area della ex-Colonia Penale, spesso in compagnia di Corvi imperiali *Corvus corax*.
* La specie è sedentaria e compie parziali erratismi invernali. Questo ind. molto probabilmente appartiene alla vicina popolazione delle Alpi Apuane. Si conoscono segnalazioni storiche della specie nell'Arcipelago Toscano, dove questa specie risulta accidentale (Arcmamone ined.).

Osservazioni sul flusso migratorio primaverile del Corvo *Corvus frugilegus* in Sicilia.

C. Cardelli, A. Corso e R. Ientile

Singoli ind. sono stati osservati il 10 aprile 1998 e il 29 febbraio 1999 da Ganzirri-Torre Faro in volo sullo Stretto di Messina. Il 6 febbraio 2000 sono stati osservati dal Monte Dinnamare (ME) 3 ind. sempre sullo Stretto.
* Queste osservazioni, unitamente ad altre in anni precedenti (Corso in Arcamone e Brichetti 1997. Avocetta 21: 226), sembrano attestare la possibilità che questi ind. in risalita primaverile sullo Stretto di Messina possano appartenere ad un piccolo nucleo svernante in Sicilia, in qualche area interna non conosciuta.

Presenza invernale di Storno roseo *Pastor roseus* in Emilia-Romagna.

A. Corso, L. Cattini e A. Schianchi

Un juv. è stato rinvenuto ferito a Fidenza (PR) il 28 novembre 1999 e recapitato al Centro Rapaci di Parma. L'esemplare è attualmente conservato nel Museo INFS.
* La specie oltre ad essere irregolare in Italia è estremamente rara in autunno e inverno.

Avvistamento di un ibrido di Passera sarda *Passer hispaniolensis* x Passera mattugia *Passer montanus* in Sicilia.

A. Corso, R. Ientile, C. Iapichino, G. Consoli, W. Silvestrini e G. Terranova

Tra luglio e agosto 1998 un maschio adulto ibrido è stato osservato alle Saline di Siracusa, spesso in canto sui piloni della linea elettrica.
* Si tratta probabilmente del 2° ibrido conosciuto per l'Italia.

Avvistamento di Ciuffolotto scarlatto *Carpodacus erythrinus* in Sicilia.

A. Corso e C. Iapichino

Il 26 dicembre 1997 è stato osservata una femmina juv. e successivamente si è udito il verso in prossimità delle Saline di Siracusa.
* Si tratta della 1° segnalazione per la Sicilia di una specie i cui avvistamenti sono sempre più frequenti in Italia.

Osservazioni di Venturone *Serinus citrinella* sullo Stretto di Messina (Sicilia).

A. Corso e C. Cardelli

Due ind. sono stati osservati rispettivamente il 25 aprile 1998 ed il 26 febbraio 1999 in loc. Torre Faro-Ganzirri, sullo Stretto di Messina.
* Sono le prime due segnalazioni siciliane della specie. Sono praticamente sconosciute le abitudini dispersive di questa specie, in particolare della sottospecie insulare *Serinus c. corsicana*, a cui probabilmente appartenevano questi soggetti.