

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

DIREZIONE GENERALE DELL' AGRICOLTURA.

UFFICIO ORNITOLOGICO.

PRIMO RESOCONTO

DEI RISULTATI DELLA INCHIESTA ORNITOLOGICA IN ITALIA.

PARTE SECONDA

AVIFAUNE LOCALI

RISULTATI DELLA INCHIESTA ORNITOLOGICA

NELLE SINGOLE PROVINCE

COMPILATO DAL DOTTOR

ENRICO HILLYER GIGLIOLI

Professore ordinario di Zoologia e Anatomia dei Vertebrati
nel R. Istituto di Studi Superiori di Firenze, Membro del Comitato ornitologico internazionale
e Direttore dell' Ufficio ornitologico.



FIRENZE.

COI TIPI DEI SUCCESSORI LE MONNIER.

1890.

Gallinago Gallinula. Accidentale.

Larus canus. Accidentale.

Parma, (DEL PRATO dott. Alberto):

Le osservazioni intorno agli uccelli del Parmense, salvo indicazioni contrarie, non si estendono all'intera provincia. Sono anzi per la maggior parte compiute nel breve tratto del circondario di Parma che inferiormente all'Emilia fino al Po, va dal torrente Enza fino all'altro detto Rovacchia; al quale tratto si deve aggiungere una breve porzione della destra del Po fra lo sbocco dell'Enza e la città di Guastalla. Tutta questa regione è assolutamente piana ed è solcata da tre grossi torrenti, l'Enza, il Parma ed il Taro di un regime molto vario, e da numerosi cavi e canali di acque perenni: essa è completamente coltivata e solo piccole porzioni di boschi si rinven- gono qua e là lungo le sponde dei torrenti; la coltivazione vi è uniforme a prati stabili ed irrigui od artificiali non irrigui, a campi di frumento e melica ed a piccoli tratti di fave, canape, orti, vigne, risaie. Attraversata questa re- gione da fitta rete di strade, è ripartita in poderi piut- tosto piccoli cinti da siepi, e le varie coltivazioni a guisa di irregolare scacchiere si intercalano l'una all'altra, onde raramente si trovano identiche condizioni per lunghi tratti. Mancano stagni d'acqua e la limitata coltivazione del riso si ha solo nelle vicinanze del Po.

Nell'estate la regione parmense è visitata da piogge temporalesche e localizzate, nell'autunno e primavera è piuttosto una regione di pioggia, e di nevi nell'inverno che si rendono spesso stabili per due o tre mesi con forte freddo e gelo.

Finalmente osservasi che vi sono poche e non rispet- tate riserve di caccia.

*Elenco delle specie di uccelli osservate
nella provincia di Parma, con nomi
vulgari locali ed indicazioni sulla fre-
quenza, nidificazione, ec.¹*

- Corvus Corax.** Accidentale; uno preso il 1 febbraio 1889 vicino a Borgotaro.
- Corvus Cornix.** Sedentaria.
- Corvus frugilegus.** Sedentario (?).
- Lycos Monedula.** Accidentale.
- Pica rustica.** Sedentaria, nidificante.
- Garrulus glandarius.** Sedentaria, nido con 2 uova 10 giugno.
- Sturnus vulgaris.** Sedentario, nidificante.
- Pastor roseus.** Accidentale, avuto il 12 gennaio 1884.
- Fringilla cœlebs.** Sedentario e nidificante.
- Fringilla Montifringilla.**
- Petronia stulta.**
- Passer montanus.** Sedentaria e nidificante.
- Passer Italiæ.** Sedentaria e nidificante.
- Coccothraustes vulgaris.** Sedentario e nidificante.
- Ligurinus Chloris.** Sedentario e nidificante.
- Chrysomitris Spinus.** Scarso.
- Carduelis elegans.** Sedentario e nidificante.
- Serinus hortulanus.** Scarso.
- Cannabina Linota.** Frequente.
- Ægiothus Linarius,** *Fanèll d'la Regenna.* Accidentale.
- Pyrrhula europæa.** Nidifica ai monti, erratico d'inverno.
- Loxia Curvirostra.** Accidentale, veduto nel 1879 e 1887 in agosto.
- Miliaria Projer.** Sedentario e nidificante.
- Emberiza Citrinella.** Frequente.
- Emberiza Cirlus.** Scarso.
- Emberiza Hortulana.** Estivo, avuto nido 8 luglio con uova.

¹ Il dott. Alberto Del Prato ha pubblicato un *Catalogo degli Uccelli fin ora rinvenuti nelle province di Parma e Piacenza.* Parma, 1881.

- Emberiza Schœniclus*. Abbastanza frequente.
Alauda arborea. Sedentaria e nidificante.
Alauda arvensis. Sedentaria e nidificante.
Galerita cristata. Sedentaria e nidificante.
Agrodroma campestris. Non raro.
Anthus pratensis. Frequente.
Anthus trivialis. Frequente.
Anthus Spipoletta. Scarso.
Budytes flavus. Frequente.
Budytes cinereocapillus. Nidificante ed estiva.
Motacilla alba. Sedentaria e nidificante.
Calobates melanope. Sedentaria e nidificante.
Saxicola Oenanthe. Estivo e nidificante.
Monticola saxatilis. Estivo, scarso e nidificante.
Merula nigra. Sedentario in parte; var. *montana* tutte femmine.
Merula torquata. Scarso.
Turdus pilaris. Scarsa.
Turdus iliacus. Non raro.
Turdus musicus. Frequente.
Turdus viscivorus. Sedentaria e nidificante.
Aëdon Luscinia. Estivo e nidificante.
Erithacus Rubecula. Frequente.
Cyanecula Wolfi. Di scarso passaggio marzo, aprile, ottobre.
Ruticilla Phœnicurus. Estivo e nidificante.
Ruticilla titys. Scarso.
Pratincola Rubicola. Frequente.
Pratincola Rubetra. Non raro.
Sylvia nisoria. Estiva, nidificante, scarsa.
Sylvia orphæa. Scarsa.
Sylvia cinerea. Estiva e nidificante.
Monachus Atricapillus. Nidificante.
Monachus hortensis. Scarso.
Pyrophthalma melanocephala. Accidentale.
Phylloscopus Trochilus. Frequente.
Phylloscopus Bonellii. Raro assai.
Phylloscopus rufus. Frequente.

- Hypolais icterina*. Non raro.
Hypolais polyglotta. Non raro.
Acrocephalus palustris. Non rara.
Acrocephalus streperus. Nidificante, avuto nido con uova il 27 maggio e ancora nella prima metà di luglio.
Acrocephalus arundinaceus. Nidificante ed estivo.
Calamodus schœnobænus. Comune nelle risaie.
Calamodus aquaticus. Raro.
Lusciniola melanopogon. Accidentale.
Locustella naevia. Accidentale; uno preso vicino a Parma il 3 ottobre 1889.
Cisticola cursitans. Scarsa.
Troglodytes parvulus. Sedentario e nidificante.
Cinclus aquaticus. Sedentario e nidificante, non varia; erratico d'inverno.
Accentor modularis. Comune.
Regulus cristatus. Comune.
Regulus ignicapillus. Non raro.
Ægithalus pendulinus. Avuto il nido una sola volta.
Acredula rosea. Sedentaria e nidificante.
Parus major. Sedentaria e nidificante; 12 giugno uova in sviluppo.
Parus ater. Per caso straordinario fu comune nell'inverno 1887-88.
Cyanistes cæruleus. Sedentaria e nidificante.
Pœcile palustris. Sedentaria e nidificante.
Sitta cæsia. Sedentario e nidificante.
Certhia brachydactyla. Sedentario e nidificante.
Tichodroma muraria. Erratico.
Oriolus Galbula. Estivo e nidificante; 8 luglio i piccoli.
Lanius Excubitor. Scarsa.
Lanius minor. Estiva e nidificante.
Lanius Collurio. Estiva e nidificante.
Lanius auriculatus. Estiva e nidificante.
Muscicapa collaris. Scarsa, di passo ai primi d'aprile.
Muscicapa Atricapilla. Non comune.
Butalis Grisola. Scarso.

- Hirundo rustica*. Estiva e nidificante.
Chelidon urbica. Estivo e nidificante.
Clivicola riparia. Estivo e nidificante.
Cypselus Apus. Estivo e nidificante.
Cypselus Melba. Due sole catture.
Caprimulgus europæus. Estivo, l'8 agosto ebbi nidiaceo.
Picus major. Sedentario e nidificante.
Picus minor. Sedentario e nidificante.
Gecinus viridis. Sedentario e nidificante.
Iynx Torquilla. Estivo e nidificante.
Cuculus canorus. Non raro.
Alcedo Ispida. Sedentario e nidificante.
Coracias Garrula. Avuta il 28 aprile e nella prima metà del settembre.
Merops Apiaster. Estivo e nidificante; ebbi le uova il 13 giugno.
Upupa Epops. Non rara.
Strix flammea. Sedentario e nidificante.
Syrnium Aluco. Sedentario e nidificante, il 24 maggio giu-
vane già svelto.
Asio Otus. Scarso.
Asio accipitrinus. Non comune.
Athene Noctua. Sedentaria e nidificante.
Scops Giu. Estivo e nidificante.
Bubo maximus. Sedentario, scarso, fors' anche di passo.
Circus æruginosus. Di passaggio scarso, avuto il 6, 8, 17
aprile.
Circus cyaneus. Di passaggio scarso, 7 aprile ed ottobre.
Circus Swainsoni. Rara.
Pandion Haliaëtus. Accidentale, il 26 settembre 1880.
Circaëtus gallicus. Assai raro.
Haliaëtus Albicilla. Di passaggio scarso; presa 3 volte, una
il 5 dicembre.
Aquila Chrysaëtus. Sedentaria.
Aquila clanga. Accidentale.
Buteo vulgaris. Sedentaria.
Archibuteo lagopus. Accidentale affatto.

- Pernis apivorus*. Accidentale.
Milvus Ictinus. Accidentale, il 30 novembre 1885.
Falco Peregrinus. Sedentario, ma scarso ed erratico d'inverno.
Hypotriorchis Subbuteo. Scarso.
Æsalon regulus. Non raro.
Cerchneis Tinnunculus. Sedentario e nidificante.
Cerchneis vespertinus. Di passo, avuto dal 23 aprile al
1° 8 maggio.
Astur palumbarius. Accidentale, un maschio giovane il
10 ottobre 1883.
Accipiter Nisus. Sedentario.
Gyps fulvus. Accidentale, un maschio giovane il 21 ot-
tobre 1885.
Pelecanus Onocrotalus. Accidentale.
Phalacrocorax Carbo. Accidentale.
Ardea cinerea. Sedentario e specialmente invernale.
Ardea purpurea. Scarso.
Egretta Garzetta. Avuta il 12 maggio; scarsa, di passaggio.
Ardeola ralloides. Avuta il 27 apr.; scarsa, di passo soltanto.
Ardetta minuta. Estivo, frequente.
Botaurus stellaris. Di passo in marzo e novembre.
Nycticorax griseus. Di passo in aprile, rari i giovani.
Ciconia alba. Rare volte si vede nella seconda metà d'agosto.
Ciconia nigra. Di passo in aprile ed agosto.
Platalea Leucorodia. Accidentale.
Plegadis Falcinellus. Veduto il 23 aprile ed il 5° ottobre;
scarso, di passo soltanto.
Cygnus musicus. Accidentale nel marzo 1888.
Anser segetum. Scarsa.
Tadorna cornuta. Accidentale.
Anas Boscas. Anche nidificante.
Spatula clypeata. Non raro.
Dafila acuta. Comune.
Mareca Penelope. Comune.
Nettion Crecca. Comune.
Querquedula Circia. Comune.
Fuligula rufina. Accidentale.

- Fulix ferina*. Comune.
Fulix Fuligula. Non rara.
Fulix Nyroca. Non rara.
Bucephala Clangula. Non comune.
Ædemia fusca. Non tanto raro.
Erismatura leucocephala. Accidentale.
Mergus Merganser. Accidentale.
Mergus Serrator. Non comune.
Mergellus Albellus. Scarsa.
Columba Palumbus. Nidificante, ma scarso.
Columba Oenas. Non comune.
Turtur tenera. Estiva e nidificante.
Syrhaptus paradoxus. Accidentale il 27 maggio 1888.
Perdix rufa. Sedentaria, scarsa.
Perdix saxatilis. Sedentaria ed abbastanza frequente.
Starna Perdix. Sedentaria e nidificante.
Coturnix communis. Estiva e nidificante.
Rallus aquaticus. Abbastanza comune.
Ortygometra Porzana. Abbondante.
Ortygometra Bailloni. Non rara.
Ortygometra parva. Non rara.
Crex pratensis. Estivo, nidificante, ma scarso.
Gallinula chloropus. Sedentaria.
Fulica atra. Sedentaria.
Otis Tarda. Accidentale.
Otis Tetrax. Accidentale.
Ædicnemus scolopax. Estivo e nidificante.
Charadrius Pluvialis. Di passo.
Eudromias Morinellus. Accidentale.
Ægialitis curonica. Abbastanza frequente.
Ægialitis Hiaticula. Non raro.
Vanellus Capella. Comune.
Hæmatopus Ostralegus. Accidentale in aprile.
Recurvirostra Avocetta. Accidentale.
Himantopus candidus. Di passo soltanto.
Actodromas minuta. Di passaggio, 8-10 maggio.
Actodromas Temmincki. Di passaggio, 16 maggio.

- Machetes Pugnax.** Scarsa.
Pelidna alpina. Raro assai.
Tringoides Hypoleucus. Abbastanza frequente.
Totanus Ochropus. Non raro.
Totanus Glareola. Scarso.
Totanus stagnatilis. Di passo, 7-23 aprile.
Totanus Calidris. Di passo 21 marzo, 22 aprile, scarsa.
Totanus fuscus. Scarsa.
Totanus nebularius, *Gambinon.* Non comune.
Limosa melanura, *Arsega.* Di passaggio, avuta il 27 aprile.
Scolopax Rusticula. Comune di passo.
Gallinago major. Di passo, 28-31 marzo, scarso.
Gallinago caelestis. Di passo, avuto il 26 dicembre.
Gallinago Gallinula. Non raro.
Numenius Arquata, *Pizzacra d'mar.* Non comune.
Sterna fluviatilis. Comune.
Sternula minuta. Scarso.
Hydrochelidon nigra, *Magnanen.* Comune.
Chrocephalus ridibundus. Non raro.
Larus canus. Di scarso passaggio.
Colymbus glacialis. Accidentale.
Podiceps cristatus. Non raro.
Podiceps cornutus. Accidentale, solo i giovani.
Podiceps nigricollis. Di passaggio scarso.
Podiceps fluviatilis. Sedentario.

Sottoregione Peninsulare o Meridionale.

LIGURIA.

Genova, zona meridionale del circondario di Savona
(PICCONE cav. Enrico):

Il circondario di Savona ha per confini gli Appennini al N., il Mediterraneo al S., il Capo Noli ad O., e il torrente Levone (tra Cogoleto e Arenzano) ad E. È diviso