# Recenti casi di svernamento di Occhione *Burhinus oedicnemus* in Italia settentrionale

MARIA ELENA FERRARI*, MASSIMO SALVARANI*, GUIDO SARDELLA**, MARCO GUSTIN***
** via U. La Malfa 2, 43100 Parma (mariel.f@libero.it) - ** via Cadonica 285, 43051 Albareto (PR) - *** LIPU, Settore Conservazione, via Trento 49, 43100 Parma.*

**Introduzione** - In Italia l'Occhione *Burhinus oedicnemus* sverna lungo le coste del Tirreno (Maremma toscana), nelle isole maggiori (Baccetti *et al.* 2002) e occasionalmente in Lazio (Biondi e Petrelli 1995) e Puglia (Meschini 1991). Lo svernamento a nord della Toscana è da ritenersi un evento raro e talvolta legato a individui giovani e/o debilitati. In questo studio si presenta una revisione delle segnalazioni di svernamento per l'Italia settentrionale e si documenta il recente svernamento di Occhioni in due località del parmense.

**Area di studio e metodi** - Per la revisione, sono stati considerati i dati pregressi di svernamento di *B. oedicnemus* in Italia settentrionale compresi tra novembre e gennaio. Le aree di studio in cui sono stati osservati Occhioni svernanti sono ubicate lungo il fiume Taro in loc. Fontevivo, dal ponte della SS Emilia sino al ponte dell'Autostrada A1, altitudine 50 m s.l.m. (44°46' N, 10°14' E) e lungo il torrente Parma nei pressi di Basilicagoiano, altitudine 115 m s.l.m. (44°43' N, 10°22' E). In entrambi i siti è vietato l'esercizio venatorio, essendo rispettivamente Oasi di Protezione della Fauna e Zona di Ripopolamento e Cattura.

**Risultati e discussione** - Segnalazioni di individui svernanti a nord della Toscana sono scarse, riferite a singoli individui, e sono note per la Liguria (4 segnalazioni; Boschetti 1906, Spanò e Truffi 1987; B. Caula, *com. pers.* 2001), la Romagna (3 segnalazioni; Foschi 1984), il Piemonte (1 segnalazione; Della Tofola e Maffei 1990) e l'Emilia (1 individuo morente, PR; E. Pollonara, *com. pers.* 2000). Dal 29 novembre 2002 al 28 gennaio 2003 sono stati osservati sino a un massimo di 17 individui in un ampio ghiaieto del fiume Taro nell'Oasi di Fontevivo, sito utilizzato dalla specie anche in periodo riproduttivo (Tabella 1). Inoltre, il 10 e il 17 gennaio 2003 sono state effettuate due osservazioni di un singolo individuo lungo il torrente Parma (M. Pastres e C. Fietta, *com. pers.*). La continuità delle osservazioni effettuate a partire dalla primavera 2002 nell'Oasi di Fontevivo esclude la possibilità che si tratti di migratori tardivi o precoci, e lascia supporre che si tratti degli stessi individui che hanno nidificato e che sono nati nell'area. È questo il primo caso di svernamento accertato di *B. oedicnemus* in provincia di Parma e rappresenta probabilmente il più consistente nucleo svernante mai osservato in Italia settentrionale.

Tab. 1. Osservazioni di Occhioni svernanti nell'Oasi di Fontevivo (PR) dal novembre 2002 al gennaio 2003.

| Data | N° ind | Note | Osservatori |
|---|---|---|---|
| 29/11/2002 | 2 | In volo | Ferrari, Salvarani |
| 12/01/2003 | 17 | In greto | Ferrari, Salvarani, Sardella |
| 14/01/2003 | 12 | In greto | Ferrari, Ravasini, Salvarani |
| 16/01/2003 | 5 | In greto | Pedrelli |
| 28/01/2003 | 13 | In greto | Chierici |

**Ringraziamenti** - Az. Agr. Sperim. STUARD (PR), N. Baccetti, S. Bertè, R. Carini, B. Caula, E. Chierici, C. e F. Fietta, U. F. Foschi, M. e B. Ghiretti, C. Guzzon, M. Labadini, M. Mendi, M. Pastres, M. Pedrelli, E. Pollonara, M. Ravasini, F. Roscelli, R. Tinarelli.

**Bibliografia** - Baccetti N. *et al.* 2002. Biol. Cons. Fauna 111: 138-139. • Biondi M. e Pietrelli L. 1995. Avocetta 19: 80. • Boschetti G. A. 1906. Avicula 10: 44-53. • Della Toffola M. e Maffei G. 1990. Riv. Piem. St. Nat. 11: 215-237. • Meschini A. 1991. Suppl. Ric. Biol. Selvaggina 17: 467-470. • Spanò S. e Truffi G. 1987. Reg. Liguria, Sagep, Genova.