Presenza di Grillai *Falco naumanni* sul Massiccio della Maiella in maggio

R. Bagnoli, Cerasoli M., Mariotti A., Penteriani V., Pinchera F

Almeno 10 individui sono stati ripetutamente osservati in caccia l'8 maggio 1989 in un'area a prato-pascolo del versante nord-occidentale della Maiella (PE, Abruzzo), a quote comprese tra 800 e 1000 m.

• Considerando che normalmente i siti riproduttivi vengono occupati entro metà aprile (es. Massa 1985, Nat.Sicil.IX, no.spec.) e che nella zona di caccia erano presenti delle rupi, un'eventuale nidificazione non è da escludersi. Sempre per l'Abruzzo è nota una precedente segnalazione riguardante 5 individui osservati il 29 gennaio 1988 e ritenuti in arrivo precoce in una possibile zona di nidificazione (Pellegrini et al.1988, Riv.ital.Orn.58:208).

Insolita presenza di Falchi della Regina *Falco eleonorae* in provincia di Parma

F. Zanichelli; L. Zanichelli, C. Blamonti

Il 23 agosto 1988 sono stati osservati a lungo 7 individui (due della forma scura) in località Signatico (PR), nella vallata del torrente Parma, mentre cacciavano insetti.

• Questo Falconidae, attualmente nidificante con certezza in isole e zone costiere della Sardegna, nelle Eolie e nelle Pelagie, compare solo occasionalmente nell'entroterra. Recente è la segnalazione di 8 individui (probabilmente immaturi estivanti) il 12 settembre 1986 nel Lazio settentrionale, nella zona dei Monti della Tolfa (Liberatori et al.1987, Riv.ital.Orn.57:266-267). Per il Piemonte sono note due segnalazioni recenti (1977, 1983), entrambe riferibili a località dell'Alessandrino distanti solo 6 Km l'una dall'altra (Boano e Mingozzi 1985, Riv.Piem.St.Nat.6:3-67).

Segnalazione di Labbo codalunga *Stercorarius longicaudus* sulle Prealpi Bergamasche.

F. Perugini

Il 25 settembre 1988 è stato rinvenuto morto un individuo giovane sul Monte Avaro, a circa 2000 m di altitudine, nell'alta Valle Brembana (BG).

• Di recente, Boano (1988 (Sitta 2: 93-98) ha evidenziato come questa specie sia la più frequente del genere in Piemonte e verosimilmente anche nelle altre regioni alpine. Le comparse si concentrano nel periodo post-nuziale e riguardano per il 90% individui giovani. Stessa situazione si è riscontrata in Lombardia (P.Brichetti ined.).

Osservazione invernale di Mignattino *Chlidonias niger* in Toscana

F. Cianchi, A. Massi

Il 16 gennaio 1988 è stato osservato un individuo a Bocca d'Ombrone (GR).

• Viene riconfermata la presenza invernale di questo Sternidae estivo nelle zone costiere della maremma grossetana (un ind.1 dicembre 1986, Laguna di Ponente di Orbetello; Arcamone e Tellini 1987, Quad. Mus.St.Nat.Livorno). Per altre recenti segnalazioni invernali in Emilia Romagna, vedasi questa rubrica in Avocetta 1988,12: 132.