Censimenti IWC 2009

di ROBERTO TINARELLI

Nel gennaio 2009 l'AsOER ha supportato e organizzato i censimenti degli uccelli acquatici svernanti nelle stesse province dell'Emilia-Romagna già coperte nel 2008. Ciò è stato possibile grazie ad una buona rete di rilevatori e di coordinatori locali (Franco Roscelli per Parma, Luca Bagni per Reggio-Emilia, Giuseppe Rossi per Modena, Roberto Tinarelli per Bologna e Ferrara, Fabrizio Borghesi e Ariele Magnani per Ravenna e Ariele Magnani per Rimini) che hanno attivato varie forme di collaborazione con le amministrazioni provinciali.

I censimenti sono stati effettuati principalmente Venerdì 9 nel comprensorio di Comacchio e nelle zone umide costiere a nord di Ravenna, Martedì 13 nelle zone umide costiere a nord di Comacchio (contemporaneamente alla provincia di Rovigo) e nelle zone umide interne e a sud di Ravenna, Venerdì 16 nelle Valli di Argenta e nelle province di Bologna, Modena, Reggio-Emilia e Rimini, dal 16 al 18 gennaio nel Parmense.

Il Gennaio 2009, a differenza degli anni precedenti, è stato caratterizzato da condizioni meteorologiche complessivamente vicine alla norma sia a livello europeo sia a livello regionale. In Dicembre vi sono state piogge particolarmente abbondanti, soprattutto nella prima metà del mese, come nel resto d'Italia, e temperature nella norma; forti gelate dal 27-28 Dicembre hanno determinato dal 28-29 la chiusura per ghiaccio della maggior parte delle zone umide d'acqua dolce dell'interno (le Valli di Argenta risultavano ghiacciate per il 95% il 30 Dicembre) per 7-10 giorni nel Ferrarese e per un periodo maggiore mano a mano che si procede verso l'interno (fino al 14-15 gennaio nel Bolognese e oltre 3 settimane nel Parmense). Le nevicate del 27-28 Dicembre sono state deboli nel Ferrarese e nella pianura romagnola; tracce di neve in pianura sono rimaste fino a circa la prima settimana di Gennaio nel Bolognese mentre il settore occidentale della pianura emiliana era ancora quasi interamente coperto dalla neve attorno al 20 gennaio. La presenza della neve durante i censimenti ha ostacolato i rilevamenti nelle zone umi-

Photo F. Gardosi

Gabbiano comune

de montane e lungo i corsi d'acqua nel Parmense. Gennaio è stato caratterizzato anche da estese e fitte nebbie che hanno limitato la visibilità nelle prime ore della giornata ma che non hanno impedito lo svolgimento dei censimenti nei giorni prefissati.

Sono stati censiti complessivamente 229.188 uccelli acquatici di 86 specie che dipendono per tutto o parte del loro ciclo biologico dalle zone umide (vedi Tabella 1). Rispetto al 2008 vi è stato un aumento complessivo del 6% degli uccelli censiti nonostante le gelate che hanno interessato gli specchi d'acqua per buona parte del periodo dei censimenti. In tutte le province vi è stato un incremento degli uccelli censiti ad eccezione di Parma (vedi Tabella 2) dove il gelo degli specchi d'acqua si è protratto più a lungo.

La maggior parte degli uccelli censiti è costituita da anatre (34,8%), seguite per importanza da laridi (20%), limicoli (15,1%) e folaga (14,4%) (vedi Figura 1).

Complessivamente, rispetto al 2008, vi è stato un incremento delle oche (+36%), dei laridi (+27,2%) e degli svassi (+2,7%) mentre vi è stata una diminuzione dei rapaci (-21,8%), della folaga (-20,4%), degli aironi (-15,8%) e delle anatre (-1,5%).

Come negli anni precedenti, le aree con il maggiore numero di uccelli censiti risultano: comprensorio delle Valli di Comacchio, compensorio di Valli Bertuzzi e Sacca di Goro, Pialasse e Valli ravennati, comprensorio Foce Bevano, Classe e Salina di Cervia, zone umide della pianura bolognese centrale e orientale, Valli di Argenta, Valli di Mortizzuolo.

Tra le specie di rilevante interesse rispetto agli anni precedenti si possono segnalare:

- 1 svasso cornuto nel Lago delle Nazioni (FE),
- 3 Marangoni dal ciuffo in Valle Bertuzzi (FE),
- lo svernamento per il terzo anno consecutivo di Mignattaio (5) nel Modenese,
- 1 Cavaliere d'Italia nell'ex risaia di Bentivoglio (BO),
- 1 Voltolino e 1 Corriere piccolo nelle Valli di Mortizzuolo e S. Martino Spino (MO),
- 13 Albastrelli in varie località del Ferrarese e del Ravennate.

Occorre infine sottolineare che, considerando complessivamente i tempi e le modalità di svolgimento dei censimenti nel gennaio 2009, i valori rilevati possono essere considerati:

- rappresentativi della consistenza reale delle popolazioni di Svasso maggiore, Svasso piccolo, Spatola, Fenicottero, Garzetta, Cicogna bianca, Mignattaio, Cigno reale, Oca lombardella, Oca selvatica, Volpoca, Fischione, Canapiglia, Codone, Mestolone, Moriglione, Moretta, Piovanello maggiore, Pivieressa, Totano moro, Cavaliere d'Italia, Avocetta, Corriere grosso, Piovanello tridattilo, Gambecchio, Piovanello pancianera, Pettegola, Pantana, Pittima minore, Pittima reale, Voltapietre;
- indicativi dell'ordine di grandezza della consistenza reale delle popolazioni (a causa della presenza di individui anche al di fuori delle zone umide censite e/o di difficoltà di censimento) di Tuffetto, Cormorano, Marangone dal ciuffo, Marangone minore, Airone bianco maggiore, Airone cenerino, Nitticora, Airone guardabuoi, Cicogna nera, Alzavola, Germano reale, Moretta tabaccata, Quattrocchi, Orco marino, Smergo minore, Falco di palude, Albanella reale, Aquila anatria maggiore, Folaga, Fratino, Pavoncella, Chiurlo maggiore, Gabbiano comune, Gabbiano corallino, Gabbiano roseo, Gavina, Gabbiano reale nordico, Gabbiano reale mediterraneo, Gabbiano reale orientale Beccapesci;
- ampiamente al di sotto della consistenza reale delle popolazioni (a causa dell'elusività delle specie e/o della difficoltà di censirle su vaste aree) di Tarabuso, Porciglione, Gallinella d'acqua, Piviere dorato, Beccaccino, Frullino, Beccaccia, Piro piro culbianco, Piro piro piccolo.

Per Cormorano, Marangone minore ed Ardeidi in generale dati più accurati sulla consistenza delle popolazioni sono stati raccolti attraverso i censimenti ai dormitori effettuati all'inbrunire.

Tabella 1 - Risultati dei censimenti degli uccelli acquatici effettuati nel gennaio 2009 nelle province di Parma, Reggio, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Rimini

Nome scientifico	Nome comune	Parma	Reggio-E.	Modena	Bologna	Ferrara	Ravenna	Rimini	Totali
Tachybaptus ruficollis	Tuffetto	27		7	47	628	1.076	4	**1.789**
Podiceps cristatus	Svasso maggiore	7		5	35	999	388	32	**1.466**
Podiceps auritus	Svasso cornuto					1			**1**
Podiceps nigricollis	Svasso piccolo					2.045	175	37	**2.257**
Phalacrocorax carbo	Cormorano	109	339	211	1.378	5.094	699	60	**7.890**
Phalacrocorax aristotelis	Marangone dal ciuffo					3			**3**
Phalacrocorax pygmaeus	Marangone minore					992	114	20	**1.126**
Botaurus stellaris	Tarabuso	2	3	4	4	3	1		**17**
Nycticorax nycticorax	Nitticora					27			**27**
Bubulcus ibis	Airone guardabuoi		2		9	12	6		**29**
Egretta garzetta	Garzetta	11	10	22	122	449	555	5	**1.174**
Ardea alba	Airone bianco maggiore	50	60	94	340	968	109	1	**1.622**
Ardea cinerea	Airone cenerino	79	153	116	620	1.257	200	25	**2.450**
Ciconia nigra	Cicogna nera				1				**1**
Ciconia ciconia	Cicogna bianca		4		26	6			**36**
Plegadis falcinellus	Mignattaio			5					**5**
Threskiornis aethiopicus	Ibis sacro				3	1	1		**5**
Platalea leucorodia	Spatola					55	32		**87**
Phoenicopterus roseus	Fenicottero					4.469	12		**4.481**
Cygnus atratus	Cigno nero			1	2	2			**5**
Cygnus olor	Cigno reale			17	10	70	71	4	**172**
Anser albifrons	Oca lombardella					169			**169**
Anser anser	Oca selvatica			137	2.553	4.734	506		**7.930**
Tadorna ferruginea	Casarca			5					**5**
Tadorna tadorna	Volpoca		2	1	2	3.499	713		**4.217**
Anas penelope	Fischione	14	1	44	168	523	515		**1.265**
Anas strepera	Canapiglia	7		15	301	415	508		**1.246**
Anas crecca	Alzavola	313	38	1.855	9.341	5.854	3.805		**21.206**
Anas platyrhynchos	Germano reale	3.469	1.090	9.317	13.741	17.068	2.038	101	**46.824**
Anas platyrhynchos	Germano (anatra germ.)		39	34	462	45		19	**599**
Anas acuta	Codone	2		1		7	282		**292**
Anas clypeata	Mestolone	26		43	409	1.632	152		**2.262**
Netta rufina	Fistione turco					1			**1**

Nome scientifico	Nome comune	Parma	Reggio-E.	Modena	Bologna	Ferrara	Ravenna	Rimini	Totali
Aythya ferina	Moriglione	145			155	1.129	21		**1.450**
Aythya nyroca	Moretta tabaccata	2			1		5		**8**
Aythya fuligula	Moretta	19			1	170	134		**324**
Melanitta fusca	Orco marino						1		**1**
Bucephala clangula	Quattrocchi					53			**53**
Mergus serrator	Smergo minore					15			**15**
Anseriformi sfuggiti alla cattività					90	8		49	**147**
Anatre non identificate							45		**45**
Aquila clanga	Aquila anatraia mag.	1			1				**2**
Circus aeruginosus	Falco di palude		1		28	66	13		**108**
Circus cyaneus	Albanella reale	1	4	2	15	17	7		**46**
Rallus aquaticus	Porciglione	4	5	13	65	23	21		**131**
Porzana porzana	Voltolino			1					**1**
Gallinula chloropus	Gallinella d'acqua	272	219	610	1.263	510	130	73	**3.077**
Fulica atra	Folaga	411	15	753	4.816	24.450	2.521	99	**33.065**
Rallidi non identificati			2						**2**
Grus grus	Gru			9	49	3			**61**
Haematopus ostralegus	Beccaccia di mare					3			**3**
Himantopus himantopus	Cavaliere d'Italia				1	4			**5**
Recurvirostra avosetta	Avocetta				15	943	806		**1.764**
Charadrius dubius	Corriere piccolo			1					**1**
Charadrius hiaticula	Corriere grosso					8			**8**
Charadrius alexandrinus	Fratino					10	16	6	**32**
Pluvialis apricaria	Piviere dorato		38	156	526	230	897		**1.847**
Pluvialis squatarola	Pivieressa					947	5		**952**
Vanellus vanellus	Pavoncella	278	280	2.464	4.984	849	3.061	201	**12.117**
Calidris canutus	Piovanello maggiore					160			**160**
Calidris alba	Piovanello tridattilo					87			**87**
Calidris minuta	Gambecchio					3	11		**14**
Calidris alpina	Piovanello pancianera					10.768	4.437		**15.205**
Philomachus pugnax	Combattente			4		30	2		**36**
Lymnocryptes minimus	Frullino				1		1		**2**
Gallinago gallinago	Beccaccino	36	8	59	249	112	63		**527**
Scolopax rusticola	Beccaccia	1			1			7	**9**

Nome scientifico	Nome comune	Parma	Reggio-E.	Modena	Bologna	Ferrara	Ravenna	Rimini	Totali
Limosa limosa	Pittima reale					90			**90**
Limosa lapponica	Pittima minore					1	1		**2**
Numenius arquata	Chiurlo maggiore	10	1	71		711	1		**794**
Tringa erythropus	Totano moro				1	130	143		**274**
Tringa totanus	Pettegola					298	39		**337**
Tringa stagnatilis	Albastrello					2	11		**13**
Tringa nebularia	Pantana	8		1	2	62	20		**93**
Tringa ochropus	Piro piro culbianco	12	4	2	9	5	1		**33**
Actitis hypoleucos	Piro piro piccolo	2	2			30	17		**51**
Arenaria interpres	Voltapietre					55			**55**
Limicoli non identificati			20				11		**31**
Larus melanocephalus	Gabbiano corallino						73	1	**74**
Larus ridibundus	Gabbiano comune	1.085	4.207	745	1.642	11.822	7.028	826	**27.355**
Larus genei	Gabbiano roseo					57	24		**81**
Larus canus	Gavina	2		4	5	73	213	39	**336**
Larus argentatus	Gabbiano reale nordico				1	4	23	5	**33**
Larus cachinnans/ michaellis	Gabb. reale “zampegialle”						1.778		**1.778**
Larus michaellis	Gabb. reale mediterraneo	13	2.012	12	709	8.276	3.152	1.599	**15.773**
Larus cachinnans	Gabb. reale orientale					2	2		**4**
Sterna sandvicensis	Beccapesci					16			**16**
Sterna hirundo	Sterna comune					1			**1**

NUMERO TOTALE UCCELLI CENSITI	**6.418**	**8.559**	**16.841**	**44.204**	**113.261**	**36.692**	**3.213**	**229.188**
numero totale specie	**31**	**24**	**36**	**49**	**73**	**56**	**24**	**86**

Tabella 2 – Numero totale di uccelli acquatici censiti in gennaio dal 2001 al 2009

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Prov. PARMA						8.943	11.743	8.993	**6.418**
Prov. REGGIO-EMILIA								5.404	**8.559**
Prov. MODENA							22.751	13.863	**16.841**
Prov. BOLOGNA	26.887	28.309	30.461	31.062	33.899	45.613	34.564	38.376	**44.204**
Prov. FERRARA	74.073	95.702	71.605	71.566	69.609	109.719	99.127	111.887	**113.261**
Prov. RAVENNA	54.680	50.327	47.926	48.849	28.957	44.478	35.463	35.116	**36.692**
Prov. RIMINI						3.340	4.064	1.009	**3.213**
Totale uccelli censiti	155.640	174.338	149.992	151.477	132.465	209.093	207.712	214.648	**229.188**

Figura 1 – Suddivisione per specie/gruppi di specie degli uccelli acquatici censiti nel gennaio 2009



svassi	5513
aironi	5319
cormorani	9019
anatre	79768
oche	8099
folaghe	33065
rapaci	156
limicoli	34542
laridi	45434
altri	8273