Risultati dei censimenti IWC 2010 in Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, Campania, Basilicata

a cura di AsOER, AsOIM, COT, GPSO, FULCO E., LIUZZI C. & VISCEGLIA M.

Inizia con questo numero di Picus una rubrica a cadenza annuale che riassume i risultati dei censimenti del Progetto IWC (International Waterbird Census) allo scopo di fornire dati aggiornati sulla consistenza delle popolazioni di uccelli acquatici svernanti in Italia, gratificando al contempo organismi pubblici e privati e soprattutto i rilevatori che operano per la loro raccolta.

Questo primo report riguarda 5 regioni (Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, Campania, Basilicata) con 405.735 uccelli censiti ma si auspica che, considerato l'interesse per dati

complessivi e aggiornati delle popolazioni, si potranno aggiungere dal prossimo anno i risultati dei censimenti anche di altre regioni.

I dati sono stati riportati per regioni, elencate per ordine da nord a sud e da ovest a est.

In ogni tabella le specie sono riportate secondo l'ordine del modulo censimenti uccelli acquatici di Wetlands International.



Airone cenerino

EMILIA-ROMAGNA

a cura di Roberto Tinarelli – AsOER (Associazione Ornitologi dell'Emilia-Romagna ONLUS), www.asoer.org

Nell'ambito dei censimenti IWC 2010 in Emilia-Romagna organizzati e supportati dall'AsOER in collaborazione e per conto delle Amministrazioni provinciali, sono state coperte 225 zone umide in 7 province da 201 rilevatori.

Complessivamente sono stati censiti 227.920 uccelli appartenenti a 87 specie, comprese le specie esotiche aufughe e le forme domestiche di specie selvatiche. Rispetto agli anni precedenti vi è stata una leggera flessione dei totali soprattutto nelle province interne a causa delle condizioni climatiche sfavorevoli nel periodo precedente i censimenti. L'inverno 2009-2010 è stato caratterizzato da ondate di gelo e consistenti precipitazioni, anche nevose, al di sopra della norma. La più intensa ondata di neve e gelo degli ultimi 15 anni che ha colpito l'Europa centrale e la Russia a partire da metà Dicembre, ha interessato il nord Italia solo marginalmente e temporaneamente nella settimana prima di Natale con neve copiosa anche in pianura e zone umide interne completamente gelate il 19-20 Dicembre, con temperature minime di -14.0 ad Argenta, -11.5 a Comacchio, -8 a Cervia, -16 a Torrile. Il rapido rialzo delle temperature dal 22-23 Dicembre ha causato lo scioglimento della neve anche in Appennino e quindi corsi d'acqua in piena. Nelle due settimane successive il territorio regionale è stato interessato dall'afflusso di correnti relativamente fredde e da precipitazioni con neve e piogge ghiacciate fino all'8 Gennaio. Nei quindici giorni successivi in cui sono stati effettuati i censimenti l'afflusso di correnti atlantiche più miti e temperate ha fatto risalire le temperature che si sono poi mantenute su valori intorno alla media. Anche le precipitazioni si sono allineate intorno alla media del periodo mantenendo però durante i censimenti il terreno molto fangoso e il livello dell'acqua alto sia nelle zone umide con acque lentiche sia in quelle con acque lotiche.

Le specie più abbondanti sono risultate Germano reale (19,6%), Gabbiano reale mediterraneo (15,6%), Folaga (14,5%), Alzavola (10,4%), Gabbiano comune (10%).

Le specie censite con popolazioni che costituiscono una percentuale rilevante o la maggior parte della popolazione italiana sono Piovanello maggiore, Pittima reale, Voltapietre, Oca lombardella, Oca selvatica, Marangone minore, Piovanello tridattilo, Beccaccia di mare, Airone bianco maggiore.

Come negli anni precedenti alcune delle zone umide costiere sono risultate quelle con il maggiore numero di uccelli e di specie: Valli Bertuzzi (FE) con 22.558 indd. e 36 specie, Scanno e Sacca di Goro - Valle di Gorino (FE) con 14.432 indd. e 44 specie, Salina di Cervia (RA) con 15.795 indd. e 34 specie.



Censitori nella Sacca di Goro

province	Parma	Reggio Emilia	Modena	Bologna	Ferrara	Ravenna	Rimini	TOTALE
numero zone censite	23	22	13	81	57	21	8	225
Strolaga mezzana					3			3
Tuffetto	41	2	9	43	406	878		1.379
Svasso maggiore	29	3	29	38	1.118	1.016	30	2.263
Svasso piccolo					1.377	79	22	1.478
Cormorano	371	280	486	1.028	2.957	3.639	37	8.798
Marangone minore	1				316	771		1.088
Tarabuso	1		3	3	1	3		11
Nitticora			1		30			31
Airone guardabuoi		10		3	1		2	16
Garzetta	13	25	35	107	273	120		573
Airone bianco maggiore	68	158	163	341	1.005	84		1.819
Airone cenerino	144	246	199	514	1.094	147	21	2.365
Aironi non identificati		1						1
Cicogna nera				1				1
Cicogna bianca		3		39	2			44
Mignattaio			8					8
Spatola				3	1	2		6
Fenicottero					3.394	14		3.408
Cigno nero				2	1			3
Cigno reale	4	1	16	7	62	24	2	116
Oca granaiola della tundra					3			3
Oca lombardella				51	502			553
Oca selvatica	1		142	3.263	1.819	1.228		6.453
Oche non identificate		1						1
Oca facciabianca				3				3
Oca del Nilo				6	1			7
Casarca			1	1				2
Volpoca	4	1	8	10	1.252	1.030		2.305
Anatra mandarina				4				4
Fischione	46		24	66	412	901		1.449
Canapiglia	10		2	225	428	212		877
Alzavola	452	36	1.638	10.282	6.288	4.906		23.602
Germano reale	5.678	1.399	6.910	11.809	16.224	2.534	78	44.632
Anatre germanate		114		637	26	29	65	871
Codone	2		1		18	120		141
Mestolone	121	2	31	624	503	764		2.045
Fistione turco						1		•
Moriglione	352	2		138	825	176		1.493
Moretta tabaccata			1		1	1		
Moretta	16	2			165	213		390
Moretta grigia					3			
Quattrocchi					157			15
Smergo minore					27			27

province	Parma	Reggio Emilia	Modena	Bologna	Ferrara	Ravenna	Rimini	TOTALE
Anatre non identificate		3				450		453
Porciglione	5	9	18	74	18	23		147
Gallinella d'acqua	166	190	227	801	317	106	58	1.865
Folaga	500	18	1.000	4.862	18.978	7.671	41	33.070
Gru			2					2
Beccaccia di mare					35			35
Cavaliere d'Italia				2	6	1		9
Avocetta				29	621	555		1.205
Corriere grosso					15			15
Fratino					28	22		50
Piviere dorato		28	103	116	258	111		616
Pivieressa					708	17		725
Pavoncella	830	309	1.364	3.714	1.776	1.159	125	9.277
Piovanello maggiore					52			52
Piovanello tridattilo					101	101	8	210
Gambecchio				1	1	82		84
Piovanello pancianera					8.385	1.858		10.243
Combattente			1	4	1			6
Beccaccino	34	5	17	86	39	92		273
Beccaccia	1				1			2
Pittima reale					126			126
Pittima minore					1			1
Chiurlo maggiore	19		85		683	10		797
Totano moro			5	2	65	16		88
Pettegola					35	34		69
Pantana	3				77	7		87
Piro-piro culbianco	8	15	1	1	15	1		41
Piro-piro piccolo				2	16	6		24
Voltapietre					16			16
Limicoli non identificati		8						8
Gabbiano corallino						44		44
Gabbiano comune	1.218	5.172	2.105	2.704	4.012	5.943	1.678	22.832
Gabbiano roseo					4	17		21
Gavina	2	1			23	88	29	143
Zafferano	1				1	4	4	10
Gabbiano reale nordico					1	3	11	15
Gabbiano reale "zampegialle"		1.016						1.016
Gabbiano reale mediterraneo	27		29	289	8.796	19.788	6.610	35.539
Gabbiani non identificati	7						ļ	7
Mignattino piombato					3			3
Aquila di mare	1		***************************************					1
Falco di palude			3	28	58	18		107
Albanella reale	3	5	5	17	27	4		61
Gufo di palude	1				1			1

province	Parma	Reggio Emilia	Modena	Bologna	Ferrara	Ravenna	Rimini	TOTALE
Ibis sacro				2				2
Fenicottero minore	_				1			1
Oca cignoide				6			13	19
forme domestiche di Oca selvatica				21	5		1	27
Anatra falcata					1			1
Anatra muta				35				35
TOTALE individui	10.179	9.065	14.672	42.044	86.002	57.123	8.835	227.920
TOTALE specie	34	26	35	47	74	52	18	87

Tabella 2 - Risultati dei censimenti IWC 2010 in Emilia-Romagna.

